Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Rybrevant 1.600 mg oplossing voor injectie
Rybrevant 2.240 mg oplossing voor injectie
Rybrevant 2.400 mg oplossing voor injectie
Rybrevant 3.520 mg oplossing voor injectie
amivantamab

▼Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Aan het einde van rubriek 4 leest u hoe u dat kunt doen.

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt want er staat belangrijke informatie in voor u.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Rybrevant en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe wordt dit middel gegeven?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Rybrevant en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Rybrevant?
Rybrevant is een medicijn tegen kanker. Er zit de werkzame stof ‘amivantamab’ in. Dat is een antilichaam (een type eiwit). Het eiwit is zó gemaakt dat het bepaalde doelwitten in het lichaam herkent en zich eraan vasthecht.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Rybrevant wordt gebruikt bij volwassenen met een bepaald soort longkanker die ‘niet-kleincellige longkanker’ heet. Het middel wordt gebruikt als de kanker al naar andere delen van het lichaam is verspreid en als er in de kanker bepaalde veranderingen zijn. Die veranderingen zitten in een gen (een stukje erfelijk materiaal) met de naam ‘EGFR’.

De arts kan Rybrevant aan u voorschrijven:
- als het eerste medicijn dat u voor uw kanker krijgt, in combinatie met lazertinib, of
- in combinatie met chemotherapie (carboplatine en pemetrexed), nadat eerdere behandeling niet werkte. Bij die eerdere behandeling moet u een zogenaamde EGFR-tyrosinekinaseremmer (TKI) hebben gehad, of
- als het eerste medicijn dat u voor uw kanker krijgt, in combinatie met chemotherapie (carboplatine en pemetrexed), of
- wanneer chemotherapie niet meer werkt tegen uw kanker.

Hoe werkt dit middel?
De werkzame stof in Rybrevant, amivantamab, heeft als doelwitten twee eiwitten die op kankercellen zitten:
- EGFR; dat staat voor ‘epidermale-groeifactor-receptor’;
- MET; dat staat voor ‘mesenchymale-epitheliale transitiefactor’.

Dit medicijn werkt door zich vast te hechten aan deze eiwitten. Dit kan ervoor zorgen dat uw longkanker langzamer groeit of stopt met groeien. Het kan uw tumor ook kleiner maken.

Rybrevant kan in combinatie met andere geneesmiddelen tegen kanker worden gegeven. Het is belangrijk dat u ook de bijsluiters van die andere geneesmiddelen leest. Heeft u vragen over deze geneesmiddelen? Stel ze dan aan uw arts.

2. Wanneer mag u dit middel niet krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet krijgen?
- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Gebruik dit medicijn niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Twijfelt u? Praat dan eerst met uw arts of verpleegkundige voordat u dit medicijn krijgt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit middel krijgt:
- als u een longontsteking heeft gehad met de naam ‘interstitiële longziekte’ of ‘pneumonitis’.

Vertel het uw arts of verpleegkundige meteen als u een van de volgende bijwerkingen krijgt terwijl u dit medicijn gebruikt (in rubriek 4 vindt u meer informatie).
- Op het moment dat u dit medicijn ingespoten krijgt: meld élke bijwerking meteen.
- Als u plotseling moeilijk kunt ademhalen, moet hoesten of koorts krijgt. Dit kan wijzen op een longontsteking. Deze aandoening kan levensbedreigend zijn en daarom zullen zorgverleners u controleren op mogelijke verschijnselen.
- Bij gebruik in combinatie met een ander medicijn met de naam lazertinib kunnen levensbedreigende bijwerkingen (door bloedpropjes in de aderen) optreden. Uw arts geeft u tijdens de behandeling extra medicijn om bloedpropjes te helpen voorkomen en kijkt regelmatig of u daar verschijnselen van heeft.
- Problemen met uw huid. U kunt zelf zorgen dat u minder en minder ernstige huidproblemen krijgt: draag beschermende kleren en smeer u in met een breedspectrum UVA/UVB-zonnebrandmiddel. Smeer uw gezicht en volledige lichaam (behalve de hoofdhuid) ook regelmatig in met een vochtinbrengende crème of lotion (formules op basis van ceramiden of andere formules die de huid langdurig hydrateren en geen uitdrogende bestanddelen bevatten, hebben de voorkeur), zolang u dit medicijn krijgt. U moet uit de zon blijven en hiermee doorgaan tot 2 maanden na uw behandeling. Krijgt u tijdens de behandeling huidreacties? Uw arts kan u aanraden om met een of meer antibiotica te beginnen en een antiseptisch middel om uw handen en voeten te wassen om de kans op huidproblemen te verminderen of de huidproblemen minder ernstig te maken. De arts kan u ook met een of meer geneesmiddelen behandelen, of u doorverwijzen naar een huidspecialist (dermatoloog).
- Problemen met uw ogen. Kunt u slechter zien? Of doen uw ogen pijn? Vertel dat dan meteen aan uw arts of verpleegkundige. Draagt u contactlenzen? Stop daar dan mee als u last krijgt van uw ogen en neem direct contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Kinderen of jongeren onder de 18 jaar mogen dit medicijn niet krijgen. Dat is omdat niet bekend is of het middel bij deze leeftijdsgroep veilig is en helpt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Rybrevant nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of verpleegkundige.

Anticonceptie
- Kunt u zwanger worden? Dan moet u beslist zorgen voor goede anticonceptie (voorbehoedsmiddelen zoals de pil of een spiraaltje). U moet dat gebruiken zolang u wordt

behandeld met Rybrevant. Is de behandeling gestopt? Ga dan nog 3 maanden door met de anticonceptie.

Zwangerschap
- Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel krijgt.
- Het kan zijn dat dit middel slecht is voor uw ongeboren baby. Wordt u zwanger terwijl u wordt behandeld met dit medicijn? Zeg dat dan meteen tegen uw arts of verpleegkundige. U beslist samen met uw arts of het voordeel van het medicijn groter is dan het risico voor uw ongeboren baby.

Borstvoeding
Het is niet bekend of Rybrevant in de moedermelk komt. Neem contact op met uw arts voordat u dit middel krijgt. U en uw arts zullen beslissen of het voordeel van borstvoeding groter is dan het risico voor uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voelt u zich na de behandeling met Rybrevant moe of duizelig? Of zijn uw ogen geïrriteerd of ziet u slechter? Bestuur dan geen voertuig en bedien geen machines.

Rybrevant bevat natrium
Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

Rybrevant bevat polysorbaat
Dit middel bevat 0,6 mg polysorbaat 80 per milliliter. Dit komt overeen met 6 mg in een injectieflacon met 10 milliliter, 8,4 mg in een injectieflacon met 14 ml, 9 mg in een injectieflacon met 15 ml of 13,2 mg in een injectieflacon met 22 ml. Polysorbaten kunnen allergische reacties veroorzaken. Heeft u bekende allergieën? Vertel dit aan uw arts.

3. Hoe wordt dit middel gegeven?

Hoeveel wordt er gegeven?
Uw arts rekent de juiste dosis Rybrevant oplossing voor subcutane injectie voor u uit. Dat hangt af van hoeveel u weegt op het moment dat u met de behandeling begint. De eerste 4 weken krijgt u 1x per week een behandeling met Rybrevant, daarna 1x in de 2, 3 of 4 weken, afhankelijk van de behandeling die uw arts voor u heeft bepaald.

<u>Aanbevolen dosering van Rybrevant oplossing voor subcutane injectie, indien alleen toegediend of in combinatie met lazertinib</u>

Elke 4 weken:
- 1.600 mg per week voor de eerste 4 doses, en daarna 3.520 mg elke 4 weken, als u minder weegt dan 80 kg;
- 2.240 mg per week voor de eerste 4 doses, en daarna 4.640 mg elke 4 weken, als u 80 kg of meer weegt.

Elke 2 weken:
- 1.600 mg per week voor de eerste 4 doses, en daarna elke 2 weken, als u minder weegt dan 80 kg;
- 2.240 mg per week voor de eerste 4 doses, en daarna elke 2 weken, als u 80 kg of meer weegt.

<u>Aanbevolen dosering van Rybrevant oplossing voor subcutane injectie, indien toegediend in combinatie met chemotherapie (carboplatine en pemetrexed)</u>

Elke 3 weken:

- 1.600 mg voor de eerste dosis, daarna 2.400 mg per week voor de volgende 3 doses, en vervolgens elke 3 weken, als u minder weegt dan 80 kg;
- 2.240 mg voor de eerste dosis, daarna 3.360 mg per week voor de volgende 3 doses, en vervolgens elke 3 weken, als u 80 kg of meer weegt.

Hoe wordt het geneesmiddel gegeven?
Een arts of verpleegkundige zal Rybrevant oplossing voor subcutane injectie bij u toedienen als een injectie onder uw huid (subcutane injectie) gedurende ongeveer 5 minuten per injectie. Het wordt gegeven in de maagstreek (buik), niet op andere plaatsen van het lichaam, en niet op plaatsen van de buik waar de huid rood, gekneusd, gevoelig of hard is of waar tatoeages of littekens zitten.

Heeft u pijn tijdens de injectie? Dan kan de arts of verpleegkundige de injectie onderbreken en u de rest van de injectie op een andere plek van uw buik geven.

Medicijnen die worden gegeven tijdens de behandeling met dit middel
Voorafgaand aan elke injectie met dit middel krijgt u medicijnen om de kans op reacties op de toediening te verlagen. Dat kunnen deze medicijnen zijn:
- medicijnen tegen een allergische reactie (antihistaminica);
- medicijnen tegen ontsteking (corticosteroïden);
- medicijnen tegen koorts (zoals paracetamol).

U kunt ook extra medicijnen krijgen, afhankelijk van welke klachten u heeft.

Heeft u te veel van dit middel gekregen?
Dit middel wordt toegediend door uw arts of verpleegkundige. Het is onwaarschijnlijk dat u te veel van dit middel krijgt toegediend (een overdosering). Als dit toch gebeurt, controleert uw arts of u bijwerkingen heeft.

Bent u uw afspraak voor toediening van Rybrevant vergeten?
Het is erg belangrijk dat u naar alle afspraken gaat. Heeft u een afspraak overgeslagen? Maak dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeg het meteen tegen uw arts of verpleegkundige als u een van de volgende ernstige bijwerkingen opmerkt:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
- Als u dit middel samen met lazertinib of chemotherapie (carboplatine en pemetrexed) krijgt, kan er een bloedpropje in de aderen komen, vooral in de longen of de benen. Dit kunt u merken aan:
  - scherpe pijn op de borst;
  - snel buiten adem zijn;
  - snelle ademhaling;
  - pijn in de benen;
  - zwelling van uw armen of benen.
- Klachten door een reactie op de injectie terwijl u het medicijn krijgt – zoals:
  - koude rillingen;
  - kortademig zijn;
  - misselijk zijn;
  - erg veel blozen;

- ongemakkelijk gevoel op de borst;
- koorts.

Dit kan vooral tijdens de eerste toediening gebeuren. Uw arts kan u hiervoor andere medicijnen geven. Of het kan nodig zijn om met de injectie te stoppen.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):
- Verschijnselen van longontsteking – zoals:
  - plotseling moeilijk ademhalen;
  - hoesten;
  - koorts.

  Dit kan uw longen blijvend beschadigen. Dat heet 'interstitiële longziekte'. Als u deze bijwerking krijgt, wil uw arts misschien dat u met dit middel stopt.
- Verschijnselen van ontsteking van het hoornvlies (keratitis), dat is de voorste laag van het oog – zoals:
  - oogpijn;
  - gevoeligheid voor licht;
  - roodheid;
  - veranderingen in het zien;
  - oogafscheiding.

  Als u deze klachten krijgt, moet u het gebruik van contactlenzen stopzetten totdat u met uw arts heeft gesproken.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):
- levensbedreigende huiduitslag met blaren en afschilferende huid over een groot deel van het lichaam. Dit heet 'toxische epidermale necrolyse';
- ontsteking van het binnenste van het oog, waardoor u slechter kunt zien (uveïtis).

Andere bijwerkingen

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):
- huiduitslag;
- nagelproblemen;
- weinig van een soort witte bloedcel (neutropenie)[b];
- weinig van het eiwit 'albumine' in het bloed;
- zich erg moe voelen;
- misselijk gevoel;
- zweertjes in de mond;
- leverproblemen[a];
- zwelling door ophoping van vocht in het lichaam (oedeem);
- weinig 'bloedplaatjes' (cellen die het bloed helpen stollen)[b];
- verstopping;
- diarree;
- minder eetlust;
- ongewoon gevoel in de huid (zoals tintelingen of een kriebelend gevoel)[a];
- meer van het leverenzym 'alanine-aminotransferase' in het bloed;
- meer van het leverenzym 'aspartaat-aminotransferase' in het bloed;
- droge huid;
- jeuk;
- braken;
- weinig kalium in het bloed;
- andere oogproblemen;
- weinig calcium (kalk) in het bloed;
- spierpijn;
- zich duizelig voelen;
- spierkrampen[a];

- koorts;
- maagpijn;
- meer van het enzym ‘alkalische fosfatase’ in het bloed;
- weinig magnesium in het bloed.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):
- aambeien;
- irritatie of pijn op de plaats waar de injectie is gegeven;
- ulcus (zweer) op de huid;
- problemen met zien;
- roodheid, zwelling, afschilferende of gevoelige huid, voornamelijk op de handen of voeten (‘hand-voet-syndroom’);
- langer worden van de wimpers;
- netelroos.

[a] Alleen gezien in combinatie met lazertinib
[b] Alleen gezien in combinatie met carboplatine en pemetrexed

Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via:
België
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
www.fagg.be
Afdeling Vigilantie
Website: www.eenbijwerkingmelden.be
E-mail: adr@fagg-afmps.be
Nederland
Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Website: www.lareb.nl
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Rybrevant oplossing voor subcutane injectie wordt bewaard in het ziekenhuis.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en de flacon na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2 °C – 8 °C). Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Chemische en fysische stabiliteit tijdens gebruik van de voorbereide spuit is aangetoond gedurende 24 uur bij 2 °C tot 8 °C, gevolgd door maximaal 24 uur bij 15 °C tot 30 °C. Vanuit microbiologisch oogpunt moet het product meteen gebruikt worden, tenzij de methode van dosisbereiding het risico van microbiële contaminatie uitsluit. Als het niet meteen gebruikt wordt, zijn de bewaartijden en omstandigheden tijdens gebruik de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Uw zorgverlener zal geneesmiddelen weggooien die niet meer worden gebruikt. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is amivantamab. In één milliliter oplossing voor injectie zit 160 milligram amivantamab. In één injectieflacon met 10 milliliter oplossing voor injectie zit 1.600 milligram amivantamab. In één injectieflacon met 14 milliliter oplossing voor injectie zit 2.240 milligram amivantamab. In één injectieflacon met 15 milliliter oplossing voor injectie zit 2.400 milligram amivantamab. In één injectieflacon met 22 milliliter oplossing voor injectie zit 3.520 milligram amivantamab.
- De andere stoffen in dit middel zijn: recombinant humaan hyaluronidase (rHuPH20), EDTA-dinatriumzout-dihydraat, ijsazijn, L-methionine, polysorbaat 80 (E433), natriumacetaat-trihydraat, sucrose en water voor injecties (zie 'Rybrevant bevat natrium' en 'Rybrevant bevat polysorbaat' in rubriek 2).

Hoe ziet Rybrevant eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Rybrevant oplossing voor subcutane injectie is een kleurloze tot lichtgele vloeistof. Dit middel is beschikbaar in een kartonnen doos met 1 glazen injectieflacon met 10 ml oplossing, 1 glazen injectieflacon met 14 ml oplossing, 1 glazen injectieflacon met 15 ml oplossing of 1 glazen injectieflacon met 22 ml oplossing.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Janssen-Cilag International NV
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
België

Fabrikant
Janssen Biologics B.V.
Einsteinweg 101
2333 CB Leiden
Nederland

Neem voor alle informatie over dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien
Janssen-Cilag NV
Tel/Tél: 0800 93 377
info_belux@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg
Janssen-Cilag NV
Tél/Tel: 800 29 504
info_belux@its.jnj.com

Nederland
Janssen-Cilag B.V.
Tel: 0800 242 42 42
info_nl@its.jnj.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2026.

Andere informatiebronnen
Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: https://www.ema.europa.eu.

De volgende informatie is alleen bestemd voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Rybrevant subcutane formulering moet worden toegediend door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Om medicatiefouten te voorkomen, is het belangrijk om de etiketten van de injectieflacons te controleren om er zeker van te zijn dat de juiste formulering (intraveneuze of subcutane formulering) en dosis aan de patiënt wordt toegediend zoals voorgeschreven. Rybrevant subcutane formulering mag alleen worden toegediend via subcutane injectie, met de aangegeven dosis. Rybrevant subcutane formulering is niet bestemd voor intraveneuze toediening.

Dit geneesmiddel mag niet worden gemengd met andere geneesmiddelen, behalve de hieronder genoemde middelen.

Maak de oplossing voor subcutane injectie als volgt klaar en ga daarbij aseptisch te werk:

Bereiding

- Bepaal de benodigde dosis en de geschikte injectieflacon(s) Rybrevant subcutane formulering die nodig is op basis van het gewicht van de patiënt bij aanvang.
- Voor elke vierwekelijkse toediening krijgen patiënten < 80 kg wekelijks 1.600 mg vanaf week 1 tot en met 4, daarna 3.520 mg elke 4 weken vanaf week 5. Patiënten ≥ 80 kg krijgen wekelijks 2.240 mg vanaf week 1 tot en met 4, daarna 4.640 mg elke 4 weken vanaf week 5.
- Voor elke tweewekelijkse toediening krijgen patiënten < 80 kg wekelijks 1.600 mg en patiënten ≥ 80 kg wekelijks 2.240 mg van week 1 tot en met 4, daarna vanaf week 5 elke 2 weken.
- Voor elke driewekelijkse toediening krijgen patiënten < 80 kg 1.600 mg op dag 1 van week 1, daarna wekelijks 2.400 mg vanaf week 2 tot en met 4, en vervolgens elke 3 weken vanaf week 7. Patiënten ≥ 80 kg krijgen 2.240 mg op dag 1 van week 1, daarna wekelijks 3.360 mg vanaf week 2 tot en met 4 en vervolgens elke 3 weken vanaf week 7.
- Haal de geschikte injectieflacon(s) met Rybrevant subcutane formulering uit de koelkast (2 °C tot 8 °C).
- Controleer of de Rybrevant-oplossing kleurloos tot lichtgeel is. Niet gebruiken als er ondoorzichtige deeltjes, verkleuring of andere vreemde deeltjes aanwezig zijn.
- Laat de Rybrevant subcutane formulering minstens 15 minuten op kamertemperatuur komen (15 °C tot 30 °C). Rybrevant subcutane formulering niet op een andere manier opwarmen. Niet schudden.
- Trek het vereiste injectievolume van de Rybrevant subcutane formulering op uit de injectieflacon met behulp van een overloopnaald en breng dit in een spuit van geschikte grootte. Kleinere spuiten vereisen minder kracht tijdens bereiding en toediening.
- Elk injectievolume mag niet meer dan 15 ml bedragen. Verdeel doses van meer dan 15 ml in meerdere spuiten met ongeveer gelijke volumes.
- Rybrevant subcutane formulering is compatibel met roestvrijstalen injectienaalden, spuiten van polypropyleen en polycarbonaat en subcutane infusiesets van polyethyleen, polyurethaan en polyvinylchloride. Indien nodig kan ook een natriumchlorideoplossing van 9 mg/ml (0,9%) worden gebruikt om een infusieset door te spoelen.
- Vervang de overloopnaald door de juiste hulpstukken voor transport of toediening. Het gebruik van een 21G tot 23G naald of infusieset wordt aanbevolen om een gemakkelijke toediening te garanderen.

Bewaren van de bereide injectiespuit

De bereide spuit dient onmiddellijk toegediend te worden. Als onmiddellijke toediening niet mogelijk is, bewaar de bereide spuit dan gekoeld bij 2 °C tot 8 °C gedurende maximaal 24 uur, gevolgd door maximaal 24 uur op kamertemperatuur van 15 °C tot 30 °C. De bereide spuit moet worden weggegooid als deze langer dan 24 uur gekoeld of langer dan 24 uur bij kamertemperatuur wordt bewaard. Als de oplossing in de koelkast wordt bewaard, moet deze vóór toediening op kamertemperatuur komen.

Terugvinden herkomst
Om het terugvinden van de herkomst van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het toegediende product goed geregistreerd worden.

Verwijdering
Dit geneesmiddel is uitsluitend voor eenmalig gebruik. Al het ongebruikte geneesmiddel of afvalmateriaal dient te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.