

Karta pacjenta przyjmującego lek TALVEY®▼

Kartę należy zawsze nosić przy sobie.
NALEŻY POKAZAĆ TĘ KARTĘ
pracownikowi ochrony zdrowia zajmującemu się pacjentem oraz gdy pacjent zgłosi się do szpitala

Zagnij tutaj

Lek TALVEY może powodować działania niepożądane takie jak zespół uwalniania cytokin (CRS) i neurotoksyczność, w tym zespół neurotoksyczności związanej z komórkami efektorowymi układu odpornościowego (ICANS).[1]

IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA:

Zagnij tutaj

Ważne informacje dla pacjenta dotyczące bezpieczeństwa

Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

Zespół uwalniania cytokin (CRS)	Neurotoksyczność, w tym ICANS
• Gorączka • Niskie ciśnienie krwi • Dreszcze • Trudności w oddychaniu • Zmęczenie • Ból głowy • Szybkie bicie serca • Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi	• Uczucie splątania • Obniżenie czujności • Uczucie dezorientacji • Uczucie senności • Spowolnienie myślenia lub trudności w myśleniu • Zaburzenia myślenia lub obniżony poziom świadomości • Stan splątania • Trudności z mówieniem i rozumieniem mowy

Zagnij tutaj

WAŻNE DO ZAPAMIĘTANIA:

Pacjent powinien pozostać przez 2 dni w pobliżu ośrodka opieki zdrowotnej, w którym otrzymał lek Talvey, w celu codziennej kontroli po podaniu wszystkich dawek wstępnej fazy stopniowego zwiększania dawki leku.

Jeśli wystąpi <u>którykolwiek</u> z objawów wymienionych w niniejszej karcie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub skorzystać z pomocy medycznej w nagłych wypadkach!

Nie są to wszystkie możliwe działania niepożądane leku TALVEY. Należy poinformować lekarza, jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, które budzą niepokój lub nie ustępują.

Lekarz prowadzący

Imię i nazwisko lekarza prowadzącego:

Numer telefonu lekarza prowadzącego :

Nazwa i adres szpitala:

Numer telefonu:

Zagnij tutaj

Informacje do wypełnienia przez zespół terapeutyczny

Należy przekazać tę kartę swojemu zespołowi terapeutycznemu w celu wypełnienia informacji i zwrócenia jej pacjentowi.

Daty wstrzyknięć leku TALVEY (schemat stopniowego zwiększania dawki):

DAWKA 1

DAWKA 2

DAWKA 3

DAWKA 4*

FAZA LECZENIA‡

*Tylko w przypadku dawkowania co dwa tygodnie.
‡Schemat dawkowania co tydzień: 0,4 mg/kg raz w tygodniu.
Schemat dawkowania co dwa tygodnie: 0,8 mg/kg raz na dwa tygodnie.

Zagnij tutaj

Ważne informacje dla pracowników ochrony zdrowia dotyczące bezpieczeństwa

U pacjentów otrzymujących produkt leczniczy TALVEY mogą wystąpić śmiertelne lub zagrażające życiu CRS i neurotoksyczność, w tym ICANS. Większość zdarzeń zgłoszonych w badaniach klinicznych była stopnia 1. lub 2.[1]

Należy zbadać pacjenta pod kątem objawów przedmiotowych i podmiotowych CRS i ICANS. Jeśli pacjent zgłasza jakiekolwiek objawy przedmiotowe lub podmiotowe, o których mowa w niniejszej karcie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym pacjenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Więcej informacji znajduje się w Charakterystyce Produktu Leczniczego Talvey.

Zagnij tutaj

▼Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji dotyczących bezpieczeństwa.

1. Charakterystyka Produktu Leczniczego TALVEY®.

EM-177904_02 październik 2025